

Вакцинація проти ВПЛ - це безпечно? Так!

Безпека демонструється:

- понад 17 років моніторингу вакцини з моменту виведення перших препаратів на ринок,
- спостереження за програмами вакцинації проти ВПЛ у понад 125 країнах світу,
- сотні мільйонів вакцинованих людей (переважно підлітки та підлітки),
- відсутність довготривалих побічних ефектів.

важливо! Вакцини проти ВПЛ є одними з найбільш ретельно перевірених вакцинних препаратів з точки зору безпеки.

**POCZĄTEK
JEST
KLUCZOWY**



Ministerstwo
Zdrowia



[Sprawdź](#) [Szczepienia.info](#)

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Одне щеплення - багато переваг

**POCZĄTEK
JEST
KLUCZOWY**

Щеплення від ВПЛ = щеплення від:

- раку шийки матки
- раку прямої кишки
 - раку піхви
 - раку вульви
- раку статевого члена
- та інших онкологічних захворювань



Ministerstwo
Zdrowia



Sprawdź →

[Szczepienia.info](https://szczepienia.info)

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Програма безкоштовних щеплень підлітків проти ВПЛ. Що потрібно знати?

Хто? Дівчата і хлопці у віці 12 і 13 років.

Чи я повинен? Ні, щеплення проти ВПЛ є рекомендованими, а не обов'язковими.

Запам'ятайте, що щеплення розширює обсяг захисту від раку шийки матки та інших захворювань, пов'язаних з ВПЛ.

Як записати дитину на щеплення?

Ви можете записати свою дитину на щеплення через:

- гарячу лінію 989 (7-20)
- електронну реєстрацію
- первинну медичну допомогу

Як? Ми вводимо 2 дози вакцини з інтервалом від 6 до 12 місяців між дозами. Рекомендований інтервал - 6 місяців.

Ministerstwo
Zdrowia



[Sprawdź →](#) [Szczepienia.info](#)

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.



Вірус папіломи людини (ВПЛ) є однією з найпоширеніших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Інфекція ВПЛ є причиною майже 100% передракових станів і раку шийки матки, 64%-100% вагінальних передракових станів і раку, 90% анального раку, 30% раку статевого члена, 5-30% раку вульви, а також викликає рак голови і шиї. Не існує ліків, які б боролися з інфекцією ВПЛ.

Вакцини є найефективнішим засобом профілактики ВПЛ-інфекції та раку, пов'язаного з ВПЛ.

Вакцини в програмі профілактичних щеплень

Вакцина MMR

Забезпечує захист дітей (щеплення обов'язкове) і дорослих (рекомендовано щеплення) від кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Перша доза у віці
13-15 місяців



Друга доза 6
років



Ефективність вакцини після двох доз:

- кір: 98%-99%
- епідемічний паротит: 79%-85%
- Краснуха: 95%-99%



З моменту
впровадження
вакцинації в 1975 році
кількість випадків кору
зменшилася на 99%.



Чи ви знаєте, чому... Щеплення від ВПЛ рекомендовані для дівчат і хлопців.



Вік 12-13 років є найкращим для щеплення і найчастіше використовується в програмах щеплень проти ВПЛ. Щеплення підлітків значно вигідніше, ніж в старших вікових групах, оскільки вони передбачають захист від контакту з вірусом ВПЛ, який виникає під час статевих відносин. Схема щеплення підлітків включає меншу кількість доз (2 замість 3) вакцини, отже, менше уколів і менше стресу, пов'язаного із щепленням.